

Application du diagnostic NANDA, NIC, NOC: douleur aiguë dans l'amélioration de la qualité de la documentation infirmière

Nikodimus Margo RinenggantyasUniversitas Diponegoro, **M Rofii**Universitas Diponegoro, **Luky Dwiantoro**Universitas Diponegoro

<https://doi.org/10.30994/jnp.v3i2.87>

Traduction et synthèse de l'article : Isabelle De Geest

Le diagnostic de douleur documenté dans la démarche en soins doit encore être évalué. La raison en est qu'il existe encore une diversité dans la formulation du problème en raison de la diversité de la formation infirmière, des connaissances infirmières et même des différences dans les normes de référence utilisées.

L'objectif de cette étude vise à découvrir si l'utilisation des classifications de diagnostic NANDA, NIC et NOC améliore la qualité de la documentation infirmière.

Une méthode d'analyse descriptive dans une population de 150 infirmières dans un hôpital en Indonésie a été utilisée. L'échantillon de l'étude était composé de 73 infirmières. La variable de cette étude est l'utilisation des classifications des diagnostics NANDA, NIC, NOC à l'amélioration de la qualité de la documentation infirmière. La recherche a utilisé des questionnaires et des tests statistiques.

L'étude montre que pour 55% des infirmières, l'utilisation des 3 classifications améliorent la qualité de la documentation infirmière. Cependant, pour maintenir une qualité dans l'écriture, il est nécessaire de pouvoir accéder à une formation régulière.

Conclusion: D'après la recherche a conclu que l'utilisation du diagnostic peut améliorer la qualité de la documentation infirmière